

Национальный календарь профилактических прививок.

(приказ 229 от 27 июня 2001 года и изменения к нему приказ 673 от 30 октября 2007 года)

12 часов	<i>В-1 гепатит Б (схемы 0-1-6; 0-3-6)</i>
3-7 день	<i>БСЖ</i>
1 месяц	<i>В-2 гепатит Б</i>
3 месяца	<i>АКДС + имовакс полио (схема 3 прививки через 45 дней)</i>
4,5 месяца	<i>АКДС + имовакс полио</i>
6 месяцев	<i>АКДС + имовакс полио + В-3 гепатит Б</i>
12 месяцев	<i>Вакцинация против кори , паротита и краснухи.</i>
18 месяцев	<i>Ревакцинация АКДС + 1 ревакцинация от полиомиелита (живая вакцина)</i>
20 месяцев	<i>2 ревакцинация от полиомиелита (живая вакцина)</i>
6 лет	<i>Ревакцинация против кори паротита и краснухи.</i>
7 лет	<i>2 ревакцинация АДС(М)</i> <i>ревакцинация - туберкулез при отрицательных реакциях манту.</i>
14 лет	<i>ревакцинация против полиомиелита (живая вакцина)</i> <i>3 ревакцинация АДС(М)-тем детям кто получил 2 ревакцинацию в 7 лет.</i>
16 лет	<i>ревакцинация АДС(М) -тем детям кто прививался по старому графику и</i> <i>имел 2 ревакцинацию в 6 лет , а 3 ревакцинацию в 11 лет.</i>

Дети от 1 года до 17 лет и взрослые с 18 до 55 лет не привитые ранее должны получать прививку от гепатита Б схема 0-1-6.

Дети от 1 года до 17 лет и девушки с 18 до 25 лет не болевшие и не привитые ранее должны иметь вакцинацию против краснухи.

Вакцинация против гемофильной инфекции (вакцина Акт-ХИБ, Хиберикс)

Схемы 1. с 3-х месяцев по схеме АКДС 3-х кратно.

2. с 6-ти месяцев 2-х кратно с интервалом 1-2 месяца с ревакцинацией в 18 месяцев.

3. после года однократно.

Ежегодно проводится вакцинация детей с 3-х лет против гриппа (Приказ Минздравсоцразвития от 23.01.11)